

VACCINATION : 1 OU 2 DOSES ?



Après une maladie COVID-19 avérée,* pour les personnes vulnérables ou en bonne santé, une dose unique entre 4 semaines et 3 mois après l'infection suffit pour être protégées efficacement.

Une seconde dose est néanmoins recommandée aux personnes immuno-supprimées.

Renseignez-vous auprès de votre pharmacien, votre médecin ou le personnel médical de votre centre de vaccination.

** La maladie de la COVID-19 est avérée par un test COVID-19 (uniquement PCR ou antigénique) ou bien par une analyse sérologique (anticorps IgG anti-SARS-CoV-2) avant ou directement après la première dose (< 2 semaines).*

Personnes vulnérables

Personnes âgées de 65+

Personnes concernées par une ou plusieurs pathologies ci-dessous:

Maladies cardiaques

Vous présentez une maladie cardiaque et, malgré les médicaments, vous avez des détresses respiratoires ou des douleurs à la poitrine.

Hypertension artérielle

Vous prenez des médicaments contre l'hypertension, mais votre tension dépasse régulièrement 160 mmHg. Vous avez de l'hypertension stabilisée mais des détresses respiratoires ou une maladie sévère des reins.

Maladies respiratoires

Vous avez une maladie pulmonaire très sévère comme, entre autres, une fibrose pulmonaire ou une forme sévère de Bronchite chronique obstructive (BPCO). S'il est bien contrôlé par des médicaments, l'asthme ne fait pas partie des affections entraînant un risque élevé.

Maladies hépatiques

Vous présentez une cirrhose du foie et avez déjà eu une ascite ou des varices œsophagiennes, ou une encéphalopathie hépatique.

Maladies rénales

Le fonctionnement de vos reins est très fortement limité.

Diabète

Vous avez une forme sévère de diabète, qui ne vous permet pas de contrôler suffisamment votre glycémie ou entraîne des maladies dans d'autres organes.

Obésité

Vous êtes en fort surpoids (IMC > 35 kg/m²).

Autre

Vous présentez une trisomie 21.

Personnes immuno-supprimées


Vous présentez une immunodéficience congénitale ou acquise suite à une maladie ou à un traitement immuno-suppresseur

Vous êtes atteint-e d'une forme sévère de l'une des maladies inflammatoires suivantes et recevez des médicaments inhibant le système immunitaire : lupus érythémateux disséminé, maladie articulaire inflammatoire sévère (polyarthrite rhumatoïde), psoriasis (sévère), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (par ex. maladie de Crohn, colite ulcéreuse).

Vous êtes infecté-e par le VIH et la maladie n'est pas bien contrôlée actuellement (CD4+ < 200 µl).

Vous avez reçu une greffe d'organe et prenez par conséquent des médicaments inhibant le système immunitaire, ou vous attendez une telle greffe.

Vous êtes actuellement traité-e pour un cancer, y compris du sang (leucémie).



www.ge.ch/c/covid19-vaccin



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE