



PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 6

DÉSINFESTATION CHIMIQUE

Votre logement est infesté par des punaises de lit.

Comment réagir ? En signalant immédiatement le problème et en laissant faire le traitement par un professionnel.

Informer

En tant que locataire, informer son propriétaire ou sa régie immobilière.

En tant que propriétaire, signaler le problème à un spécialiste de la désinfestation de parasites.

Adopter les bonnes pratiques

Eviter de tenter de régler le problème soi-même en utilisant des insecticides achetés dans le commerce. Ces produits ont un effet répulsif qui chasse les punaises vers les autres pièces de l'appartement ou les habitations voicines

Ne pas vaporiser d'insecticides sur les personnes ou les matelas car cette pratique peut s'avérer dangereuse pour la santé.

Eviter de déplacer des objets ou des meubles infestés dans les aires communes de l'immeuble.

Ne pas jeter à la rue les matelas ou les meubles et objets infestés sans qu'ils aient été au préalable hermétiquement recouverts d'un plastique.

Inscrire sur l'objet emballé et mis à la rue ou à la décharge «Infesté par des punaises de lit» afin d'éviter qu'une personne ne le récupère et ne le rapporte chez elle.

Eviter de ramener chez soi de nouveaux meubles ou matelas avant que les punaises de lit n'aient été complètement éliminées de l'habitat.

Les personnes et les animaux domestiques ne peuvent être présents durant l'application d'insecticides

Faire désinfester son habitat par un professionnel

La désinfestation chimique, c'est-à-dire avec insecticide, est une technique qui doit être uniquement utilisée par des professionnels. Deux passages sont généralement nécessaires pour éliminer les punaises et leurs œufs.

- Recommencer les traitements moins d'un mois après le premier traitement est fortement recommandé car les insecticides n'agissent pas sur les œufs. Un deuxième traitement permet de s'assurer que les punaises nouvellement écloses seront à leur tour éliminées. Il permet également de vérifier que le traitement initial a été efficace.
- S'assurer de l'éradication des punaises de lit en organisant une visite de suivi deux à quatre semaines après chaque application d'insecticide. Si l'éradication est incomplète, il faut alors en déterminer les causes et mettre en place les mesures appropriées pour éliminer efficacement les punaises de lit.

Avant le traitement par un professionnel

Pour que le spécialiste puisse faire correctement le traitement, certaines mesures doivent être appliquées.

- Respecter les consignes du spécialiste d'extermination de parasites.
- Permettre au spécialiste d'avoir accès à toutes les pièces du logement.
- Préparer l'habitat pour l'extermination : désencombrer les pièces, vider les meubles, mettre les vêtements et la literie dans des sacs hermétiquement fermés et laver en machine à 60° pendant au moins 30 minutes
- Emballer, dans des sacs poubelles, tout le contenu des armoires en vue de la désinfestation.
- Mettre les vêtements et la literie désinfestés dans des sacs hermétiquement fermés jusqu'à l'éradication des punaises de lit.







PUNAISES DE LIT

FICHE PRATIQUE - 6 (suite)

DÉSINFESTATION CHIMIQUE

Terre de diatomée

La terre de diatomée (aussi appelée diatomite ou dioxyde de silicium) est un insecticide naturel particulièrement efficace pour la lutte contre les punaises de lit. Composée de squelettes durs et silicieux d'algues microscopiques sous la forme d'une poudre qui ressemble à du talc, elle présente une abrasivité fatale pour les punaises. La poudre se colle à la carapace de la punaise et la blesse progressivement. La punaise meurt ainsi de déshydratation.

Pour une action efficace, appliquer la poudre en petite quantité et en couche fine à l'aide d'un pinceau, le long des plinthes par exemple, ou sous les pieds du lit. En raison de sa volatilité, éviter les courants d'airs. Il est également conseillé de porter des gants et un masque à poussière au moment de l'application pour éviter les effets de ses propriétés desséchantes.

La terre de diatomée est un produit qu'il convient d'employer en complément d'autres méthodes mécaniques et chimiques. Renseignez-vous auprès de professionnels de la désinfestation afin de savoir où se procurer ce produit, comment et dans quels cas l'utiliser.

A votre retour dans le logement

Pendant la désinfestation, et en raison des produits chimiques utilisés, il est parfois recommandé de quitter le logement quelques jours pour éviter une intoxication, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes.

- En général, les habitants peuvent réintégrer les lieux 6 heures après le traitement et attendre au moins 48 heures avant de marcher pieds nus sur les surfaces traitées
- Les femmes enceintes, les enfants, les personnes atteintes d'une maladie cardiaque, rénale ou respiratoire, ou souffrant d'allergies, ainsi que les animaux domestiques devraient attendre au moins 24 heures avant de réintégrer leur logement.
- Aérer les lieux après l'application d'insecticides.
- Après s'être assuré que le matelas est bien sec, mettre une alèse plastifiée et des draps propres avant de se coucher.
- Ne remettre le linge et les vêtements en place qu'une semaine après le traitement.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles avant l'éradication complète des punaises de lit de l'habitat.

Une fois le traitement effectué, il est important de restaurer les lieux afin d'éviter toute récidive. Les décollements de papier-peint, de la peinture, du plâtre, des plinthes, de la moquette, etc. sont des sites de repos et de reproduction des punaises de lit. La restauration de l'habitat permet de supprimer ces sites.

Lire aussi les fiches pratiques

- Désinfestation mécanique
- Préparation du logement avant le traitement
- Comment se débarrasser d'objets infestés
- Coût d'une désinfestation

N'essayez pas de les éliminer par vousmême! Seule une désinfestation professionnelle est efficace.

Le traitement, qu'il soit mécanique ou chimique, est curatif. Il ne protège pas d'une nouvelle infestation. Soyez donc vigilants!

Toutes les fiches pratiques sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-lit



/ 2