

Cari genitori,

L'epidemia di bronchiolite inizia solitamente in autunno, termina verso la fine dell'inverno ed è spesso causata dal virus respiratorio sinciziale (RSV). Si tratta di un'infezione respiratoria potenzialmente grave che provoca l'infiammazione dei piccoli bronchi e colpisce i bambini di età inferiore ai 12 mesi – i neonati di età inferiore ai tre mesi sono più esposti al rischio di complicanze e di ospedalizzazione.

I sintomi della bronchiolite sono:

- tosse
- febbre
- naso chiuso
- difficoltà respiratorie

Se il vostro bambino presenta questi sintomi, consultate il pediatra il prima possibile. In presenza di sintomi gravi, come un cambiamento di comportamento, se il bambino è meno reattivo, mangia meno, respira molto rapidamente o molto lentamente o in modo irregolare, o se le labbra o le estremità diventano blu, è opportuno portarlo subito al pronto soccorso.

-Si raccomandano semplici misure preventive:

- Prima dei 3 mesi di età, limitare le visite agli adulti più intimi che non sono malati.
- Lavarsi le mani (o usare una soluzione idroalcolica) prima e dopo aver toccato il bambino.
- Indossare una mascherina in caso di raffreddore, tosse o febbre.
- Se gli altri fratelli presentano sintomi di infezione virale, tenerli lontani dal bambino il più possibile durante la fase acuta dell'infezione.
- Se possibile, evitare le riunioni di famiglia e i luoghi pubblici.

Oggi è disponibile un trattamento preventivo: Beyfortus®. Questo farmaco a base di anticorpi (immunizzazione) riduce il rischio di infezione da RSV nei bambini, in aggiunta alle misure preventive. Viene somministrato in un'unica dose tramite iniezione intramuscolare.

Beyfortus® è raccomandato per tutti i neonati e i bambini di età inferiore a un anno. I costi di Beyfortus® e della sua somministrazione sono coperti dalle casse malati, ad eccezione del 10% per l'aliquota percentuale.

L'ideale sarebbe somministrare Beyfortus®:

- Nel mese di ottobre per i bambini nati tra aprile e settembre 2024.
- Nei primi giorni di vita per i bambini nati tra ottobre 2024 e fine marzo 2025.

Come tutti i medicinali, Beyfortus® può causare effetti collaterali. Sebbene non siano comuni, i possibili effetti collaterali sono:

- eruzione cutanea
- reazione nel sito di iniezione (arrossamento, gonfiore e dolore)
- febbre
- in casi molto rari, una reazione allergica.

Questi effetti collaterali possono comparire fino a qualche giorno dopo l'iniezione. In genere sono di intensità lieve o moderata e di breve durata.

Il Servizio Medico Cantonale, gli Ospedali Universitari di Ginevra e la Società Pediatrica di Ginevra raccomandano vivamente questo trattamento per i vostri bambini.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web di riferimento dell'ufficio medico cantonale
<https://www.ge.ch/c/rsv>



Le procedure per ricevere il trattamento possono essere spiegate durante la vostra permanenza nei reparti di maternità del Cantone o dal pediatra di vostro figlio.

Dott. Simon Regard,
Medico cantonale aggiunto

Dott. Arnaud L'Huillier
Primario dell'Unità di Malattie Infettive Pediatriche, HUG

Dott. Jean-Yves Corajod,
Società Pediatrica di Ginevra